


Класс ПТИЦЫ — AVES

Белоклювая гагара

Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)

Отряд Гагарообразные — Gaviiformes

Семейство Гагаровые — Gaviidae



Категория и статус редкости вида в Якутии. Категория 3 — редкий узкоареальный спорадично распространенный вид.

Распространение. Населяет тундры к востоку от р. Яны. По долинам рек проникает в лесотундру и северную тайгу. Наиболее южные находки гнезд известны из района г. Среднеколымск. Редкие встречи залетных и пролетных птиц отмечены в тундрах, расположенных к западу от р. Яны, в таежной зоне региона, а также на о-вах Большой Ляховский, Фаддеевский и Земля Бунге [1–11].

Места обитания и образ жизни. Весной в период миграций держатся по речкам и залитым водой лайдам. Предпочитает селиться на крупных, глубоких озерах водораздельной тундры с холмистым рельефом. Гнезда располагает не далее одного метра от уреза воды на островах, полуостровах, перешейках и по берегам узких заливов, защищающих постройки от

разрушения волнами и перемещающимися льдами. Гнездо имеет лоток с небольшим углублением, выстланным стеблями и листьями осок и других водных растений. Птицы, не участвовавшие в размножении, наблюдались в прибрежных районах моря [7]. Местообитания не претерпели существенных изменений. К числу ключевых местообитаний могут быть отнесены озерные системы между рр. Большая и Малая Коньковая.

Сезонные миграции наблюдаются в первой декаде июня и во второй половине сентября. На местах гнездовий появляется в первой декаде июня, к откладке яиц приступает в середине этого месяца. В кладке 1–2 яйца. Птенцы вылупляются во второй половине июля, на крыло поднимаются в сентябре. Питается молодью рыб, водными беспозвоночными.

Численность и лимитирующие факторы. Плотность повсеместно низка, за исключением низовий Колымы и Индигирки,

где местами она бывает обычной [3, 7, 9]. В тундрах между рр. Хрома и Индигирка в 1961–1962 гг. на 100 км маршрута произошло в среднем 1–1,2 взрослых особи [6]. Между рр. Большая и Малая Коньковая в 1986 г. гнездящиеся пары встречались через каждые 4,2 км [7]. По данным С.М. Слепцова, на левобережье р. Берелях в 1997–2014 гг. средняя плотность населения 0,06 особей на 10 км². Негативное влияние на популяцию оказывает добыча птиц во время миграций и их гибель в ставных рыбацких сетях. Нередко кладки поедает песец [5]. Высказывалось предположение об ухудшении условий кормодобывания гагар в связи увеличением мутности воды в результате потепления климата [9].

Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красные книги РФ [12] и РС (Я) [13]. В местах регулярного гнездования организованы ресурсные резерваты. Необходимо усилить пропаганду охраны вида, создать зоны покоя в местах регулярного гнездования и остановок пролетных птиц.

Источники информации: 1. Михель, 1935; 2. Рутилевский, 1958; 3. Воробьев, 1963; 4. Гладков, Залетаев, 1965; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Перфильев, 1987а; 7. Кречмар и др., 1991; 8. Турахов, 2002; 9. Татт, 2015; 10. Поздняков, 2017; 11. Колодезников, 2013; 12. Красная книга РФ, 2001; 13. Красная книга РС (Я), 2003.

Составитель: А.Г. Дегтярев.