

Клоктун

Anas formosa Georgi, 1775

Отряд Гусеобразные — Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae



Категория и статус редкости вида в Якутии. Категория 5 — в прошлом многочисленный вид, сокративший численность до критических показателей в последней трети двадцатого века. В двадцать первом веке отмечены признаки роста численности.

Распространение. Гнездовой ареал вида охватывает всю территорию Республики Саха (Якутия), включая о-ва Столбовой и Большой Ляховский Новосибирского архипелага [1–5]. До начала резкого снижения численности во второй половине 60-х гг. XX в. клоктун повсеместно встречался в качестве многочисленной или обычной утки [6–15]. В последней трети двадцатого века после стремительного сокращения численности его ареал уменьшился и приобрел мозаичный характер [15, 16].

Места обитания и образ жизни. Весенний прилет на места гнездовий наблюдается с начала мая до начала июня. Гнездовые местообитания этой утки приурочены к долинам рек. Птенцы появляются в кон-

це июня–начале июля. Массовый подъем на крыло происходит в первой декаде августа. Осенний пролет протекает во второй половине августа–первой половине сентября [15].

Численность и лимитирующие факторы. В прошлом один из массовых видов уток Якутии [1–15, 17–18]. Резкое сокращение численности клоктона началось во второй половине 60-х гг. прошлого века. В результате его доля в миграционных потоках снизилась более чем в десять раз к началу 70-х гг. [15].

По обобщенным материалам о количестве клоктонов во время весенней миграции (усредненные данные за сезон на один наблюдательный пункт) отмечалась следующая динамика по годам. В 1956–1960 гг. учитывалось до 4000 особей, 1961–1965 гг. — 1259, 1966–1970 гг. — 181, 1971–1995 гг. от 14 до 45 особей, а в 2000–2005 гг. количество учтенных во время весенней миграции клоктонов возросло до 1650 особей [19].

Причины сокращения численности клоктона в последней трети двадцатого века до конца не ясны [15, 20]. В конце XX—начале XXI вв. отмечены признаки роста численности, и частичное восстанов-

ление гнездового ареала этой утки [19–24]. Значительное увеличение численности клокуна наблюдалось на зимовках в Южной Корее с середины 90-х гг. прошлого века [25]. В период 2008–2010 гг. их численность оценивалась здесь от 500 тыс. до 1 млн. особей [26–27]. Однако, с 2011 г. произошло заметное снижение количества этих уток, зимующих в Южной Корее до 318,5 тыс. особей [27, 28].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу РФ [29]. Поскольку ареал клокуна полностью охватывает территорию Республики Саха (Якутии), этот вид охраняется здесь всей имеющейся на сегодняшний день системой особо охраняемых природных территорий. В качестве дополнительной меры охраны необходимо усилить разъяснительную ра-

боту среди населения и борьбу с браконьерством.

Источники информации: 1. Маак, 1886; 2. Иванов, 1929; 3. Исаков, Птушенко, 1952; 4. Рутилевский, 1957; 5. Воробьев, 1963; 6. Ткаченко, 1932; 7. Михель, 1935; 8. Сдобников, 1959; 9. Успенский и др., 1962; 10. Капитонов, 1962; 11. Кривошеев, 1963; 12. Беме и др., 1965; 13. Кречмар и др., 1978; 14. Андреев, 1987; 15. Дегтярев, Перфильев, 1998; 16. Рябицев, 2014; 17. Ларионов, 1965; 18. Перфильев, 1972; 19. Егоров и др., 2009; 20. Поздняков, 2003а; 21. Дегтярев, 2000а б; 22. Дегтярев, 2003б; 23. Волков, Поздняков, 2006; 24. Дегтярев, 2007; 25. Дегтярев и др., 2008; 26. Tajir et al., 2015; 27. Уколов и др., 2018; 28. Yu et al., 2014; 29. Красная книга РФ, 2001.

Составители: А.Г. Ларионов, Н.Н. Егоров.