Таежный гуменник

Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873
Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae





Категория и статус редкости вида в Якутии. Категория 3 — редкий спорадично распространенный подвид, численность которого сокращается.

Распространение. До середины прошлого столетия область распространения включала территорию таежной Якутии, за исключением высокогорных областей [1–4]. В последние десятилетия в связи с интенсификацией пресса охоты и хозяйственной деятельности произошло сокращение ареала до нескольких небольших очагов, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах. Незначительные агрегации линяющих холостых птиц сохранились на правобережных притоках нижней Лены, нижнего Алдана и средней Колымы [5–15].

Места обитания и образ жизни. В период миграций весной держится на разводьях рек, марях, осенью — на крупных озерах с богатой прибрежно-водной растительностью и по руслам рек, поросших топяным хвощем. Гнездовья чаще приурочены к долинам малых рек равнинных и низкогорных областей с абсолютными высотами до 400 м, причем нередко их отмечали у скальных обнажений, заселенных сапсаном и зимняком [1, 10, 12]. Гнезда устраивает на расстоянии до 300 м от водоемов, как правило, в лесу и кустарниках.

Прилетает 23 апреля–11 мая [5–9]. Птицы летят парами и небольшими группами. Осенний отлет малозаметен и происходит в конце августа и сентябре.

В южных районах приступает к гнездованию во второй декаде мая, в северных — в конце этого месяца–начале июня. В кладке 3–6 яиц, в выводках в среднем от 2 до 4 молодых. Птенцы вылупляются во второй половине июня, а на крыло поднимаются во второй половине августа.

Линяют в тех же районах, где гнездятся. Интенсивная линька начинается в первой половине июля. Перелинявшие птицы приобретают способность к полету в первой половине августа.

Весной и летом в питании заметную роль играют хвощ топяной, стрелолист плавающий, осоки, злаки, осенью — ягоды голубики [4, 7, 16].

Численность и лимитирующие факторы. В низовьях р. Вилюй, где практиковалась добыча линяющих птиц, в 1950–1965 гг. численность сократилась примерно в десять раз [4]. Относительно стабильные очаги обитания сохранились на реках, недосягаемых для маломерного флота. В 1974–1977 гг. в верховьях рр. Марха, Амга, Синяя отмечено 0,1–0,2 выводка на 10 км русла и 0,2–0,5 на 10 км береговой линии озер [7], в предгорных участках рр. Дулгалах и Дянышка — 0,6–3,7 особей на 10 км русла [11]. В 1989 и 1990 гг. в верховьях левобережных притоков р. Вилюй — рр. Лахарчана, Тюнг и Мунакан зарегистрировано 3,2–9,2 особей на 10 км русла [10]. На реках Вилюйского плато в 1987–2006 гг. средняя плотность населения составила 0,3 гнездовых пар, 1,2 птенцов, 1,1 взрослых, не размножающихся птиц на 10 км русла [14]. Причины сокращения численности: отстрел в период миграций, добыча линяющих птиц, усиление фактора беспокойства в результате промышленного освоения природных ресурсов малых рек.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в предыдущее издание Красной книги РС (Я) [17]. В местах регулярного обитания организованы ресурсные резерваты. Необходимо усилить пропаганду охраны вида, создать зоны покоя в местах регулярных скоплений линяющих птиц.

Источники информации: *1. Сдобников, 1959; 2. Воробьев, 1963; 3. Ревин, 1965; 4. Андреев, 1974; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Дегтярев, Ларионов, 1980; 7. Дегтярев, Ларионов, 1981; 8. Лабутин и др., 1988; 9. Лабутин, Перфильев, 1991; 10. Лабутин, 1992; 11. Поздняков и др., 1996; 12. Дегтярев, 2007; 13. Тирский, 2005; 14. Дегтярев и др., 2008; 15. Исаев и др., 2014; 16. Егоров, Кривошеев, 1965; 17. Красная книга РС (Я), 2003.*

Составитель: А.Г. Дегтярев.